



## **INFORMACIÓN IMPORTANTE y PRIVADA SOBRE SU SALUD POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN CON MUCHA ATENCIÓN**

### **INDICACIONES PARA TOMAR CEFIXIMA y AZITROMICINA**

Su pareja sexual ha recibido recientemente tratamiento para la gonorrea (también se llama purgación o en inglés “the clap”). La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que se puede curar y se puede contraer al tener relaciones sexuales con una persona infectada. Algunas de las personas que tienen gonorrea no saben que la tienen porque no tienen ningún síntoma y se sienten bien.

-Los hombres pueden notar una secreción del pene de color amarillento o verdoso, dolor o malestar al orinar o dolor e hinchazón de los testículos.

-Las mujeres pueden notar un flujo vaginal anormal, dolor al tener relaciones sexuales, sangrado entre los periodos menstruales o después de tener relaciones sexuales, dolor o retorcijones en la parte baja del vientre o pelvis o dolor al orinar. Las mujeres, si no reciben tratamiento, pueden quedar estériles (no podrán tener hijos en el futuro).

-Tanto en los hombres como en las mujeres la gonorrea puede causar una infección en la garganta (por medio del sexo oral) o en el recto (por medio del sexo anal).

No importa si ahora mismo tiene o no cualquiera de estos síntomas, usted puede tener gonorrea. Es importante que tome estas medicinas para prevenir que se enferme. También, usted puede volver a infectar a su pareja si tiene relaciones sexuales sin protección (sin usar un condón) antes de haberse curado de esta enfermedad.

Después de haber tomado esta medicina, lo mejor es que vaya a su médico o profesional de la salud para un chequeo de enfermedades de transmisión sexual, terapia y, posiblemente, le hagan una prueba para detectar otras enfermedades de transmisión sexual. Si no tiene médico o no tiene seguro médico, puede recibir atención médica gratuita del Departamento de Salud (llame a su oficina de salud más próxima para saber cuando le pueden atender).

### **Antes de tomar esta medicina, por favor lea la siguiente información:**

La cefixima y azitromicina son antibióticos muy seguros que se usan para curar gonorrea. Sin embargo, **NO LO TOME si usted cumple alguna de estas afirmaciones:**

- Usted es una mujer que tiene dolor en la parte baja del vientre o siente dolor al tener relaciones sexuales, tiene vómitos o fiebre.
- Está embarazada.
- Usted es un hombre y siente dolor o tiene hinchazón en los testículos o fiebre.

- Si usted ha tenido alguna vez alguna reacción adversa, como un sarpullido (urticaria o ronchas) o alergia a la penicilina o a un antibiótico relacionado (como la ampicilina, amoxicilina u otro antibiótico de cefalosporina).
  - Si usted tiene una enfermedad crónica grave del riñón, corazón o hígado, o un trastorno convulsivo (sufre convulsiones).
  - Si ahora mismo está tomando alguna otra medicina con receta médica.
  - Si alguna vez ha tenido una reacción mala – como erupción, o alergia a los siguientes antibioticos: azithromycin (“Zithromax”), erythromycin, o clarithromycin (“Biaxin”).
- Si usted cumple alguna de estas circunstancias anteriores, debe hablar con su médico lo antes posible.

Algunas personas pueden sufrir diarrea, náusea, retorcijones, indigestión, un sarpullido, dolor de cabeza, vómitos, picazón o una infección vaginal por hongos después de haber tomado cefixima o azithromycin. Estos síntomas no duran mucho tiempo, pero si persisten, póngase en contacto con su médico.

**Si nota otros efectos secundarios o una reacción alérgica (como un sarpullido, picazón, hinchazón, mareos o problemas para respirar) debe llamar a su médico inmediatamente.**

**Tome las tabletas de cefixima y azithromycin con agua o con comida. Es importante que tome estas medicinas lo antes posible para que pueda curarse.**

***No comparta esta medicina ni tampoco se la dé a nadie.***

No tenga relaciones sexuales durante los siete días después de haber tomado la medicina. **Son necesarios siete días para estar seguro de que esta medicina tenga efecto y cure la gonorrea.** Si usted tiene relaciones sexuales sin protección (sin usar un condón) cualquiera de los siete días después de haber tomado la medicina, todavía puede infectar a sus parejas sexuales. Aunque los condones son efectivos, la forma más segura de no pasarle la infección a nadie es no tener relaciones sexuales por siete días después de haber tomado la medicina.

Si usted tiene preguntas sobre las medicinas o la gonorrea, por favor llame al:

\_\_\_\_\_

(nombre)

\_\_\_\_\_

(numero)

Todas las llamadas son confidenciales. **Nadie le preguntará su nombre.**